

Información de Dosificación Profesional para Bebés y Niños



SÍNTOMAS

INGREDIENTES ACTIVOS

DOSIFICACIÓN DE PAUTAS

FRECUENCIA DE DOSIFICACIÓN

SABORES

			Reductor de la Fiebre/Mitigador de Dolor					Remedios del Frío y de la Gripe						Alergia			Relevación del Gas		
			Discontinued Sept 2011												Discontinued Aug 2011				
			Fiebre / Dolor	Fiebre / Dolor	Fiebre / Dolor	Fiebre / Dolor	Fiebre / Dolor	Fiebre, Garganta Dolorida, Tos, Nariz Congestionada, Estornudando, Nariz Que Moquea	Fiebre, Garganta Dolorida, Tos, Estornudando, Nariz Que Moquea	Fiebre, Garganta Dolorida, Tos	Fiebre, Garganta Dolorida, Tos, Nariz Congestionada, Estornudando, Nariz Que Moquea	Tos, Enrarece La Congestión y Afloja El Moco	Nariz Congestionada	Tos y Nariz Congestionada	Ojos Que Pica, Acuosos, Garganta Que Pica Y Nariz, Estornudando, Nariz Que Moquea	Nariz Congestionada, Ojos Que Pica, Acuosos, Tos y Nariz, Estornudando, Nariz Que Moquea	Ojos Que Pica, Acuosos, Garganta Que Pica Y Nariz, Estornudando, Nariz Que Moquea	Gas	
			Por 0.8 mL: Acetaminophen 80 mg	Por 5 mL (1 tsp): Acetaminophen 160 mg	Por 5 mL (1 tsp): Acetaminophen 160 mg	Por 1.25 mL: Ibuprofen 50 mg	Por 5.0 mL (1tsp): Ibuprofen 100 mg	Por 5 mL (1 tsp): Acetaminophen 160 mg, Chlorpheniramine maleate 1 mg, Dextromethorphan HBr 5 mg, Phenylephrine HCl 2.5 mg	Por 5 mL (1 tsp): Acetaminophen 160 mg, Chlorpheniramine maleate 1 mg, Dextromethorphan HBr 5 mg	Por 5 mL (1 tsp): Acetaminophen 160 mg, Chlorpheniramine maleate 1 mg, Dextromethorphan HBr 5 mg, Phenylephrine HCl 2.5 mg	Por 5 mL (1 tsp): Dextromethorphan HBr, USP 5 mg, Guaifenesin, USP 100 mg	Por 5 mL (1 tsp): Phenylephrine HCl 2.5 mg	Por 5 mL (1 tsp): Dextromethorphan HBr 5 mg, Phenylephrine HCl 2.5 mg	Por 5 mL (1 tsp): Diphenhydramine HCl 12.5 mg	Por 5 mL (1 tsp): Diphenhydramine HCl 12.5 mg, Phenylephrine HCl 5 mg	Por 5 mL (1 tsp): Cetirizine Hydrochloride 5 mg	Por 0.3 mL: Simethicone 20 mg		
DOSIFICACIÓN DE PAUTAS	Pesos	Edad						No Recomendado											
	6-11 lbs	0-3 meses	*0.4 mL	*1.25 mL	Use PediaCare® Acetaminophen Infantiles	Preguntar al Doctor	Use PediaCare® Infantiles IB Ibuprofen Concentrado Suspension Oral	No Recomendado										Preguntar al Doctor	0.3 mL
	12-17 lbs	4-11 meses	*0.8 mL	*2.5 mL				No Recomendado										Preguntar al Doctor	0.3 mL
	18-23 lbs	12-23 meses	*1.2 mL	*3.75 mL				No Recomendado										Preguntar al Doctor	0.3 mL
	24-35 lbs	2-3 años	1.6 mL (0.8+0.8 mL)	5 mL	5 mL (1 tsp)	Usar PediaCare® Niños IB Ibuprofen Suspension Oral	5 mL	No Recomendado										½ tsp(2.5 mL) una vez diariamente si la dosis es necesaria, se puede aumentar a un máximo una vez del diario 1tsp (5 mL) o de 1/2tsp (2.5 mL) cada 12 horas. No dé más que 1tsp (5 mL) sobre 24 horas	0.6 mL
	36-47 lbs	4-5 años	Usar PediaCare® Niños Acetaminophen Suspension Oral	Usar PediaCare® Niños Acetaminophen Suspension Oral	7.5 mL (1 1/2 tsp)		7.5 mL	*5 mL (1 tsp)	*5 mL (1 tsp)	*5 mL (1 tsp)	*5 mL (1 tsp)	2.5-5 mL (1/2-1 tsp)	5 mL (1 tsp)	5 mL (1 tsp)	*2.5 mL (1/2 tsp)	*2.5 mL (1/2 tsp)	5 mL (1tsp) o 10 mL (2tsp) una vez diariamente dependiendo de la severidad de síntomas. No tome más que 10 mL (2tsp) sobre 24 horas		0.6 mL
	48-59 lbs	6-8 años			10 mL (2 tsp)		10 mL	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	5-10 mL (1-2 tsp)	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	5 mL (1 tsp)	5 mL (1 tsp)	0.6 mL		
	60-71 lbs	9-10 años			12.5 mL (2 1/2 tsp)		10 mL	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	5-10 mL (1-2 tsp)	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	5 mL (1 tsp)	5 mL (1 tsp)	0.6 mL		
72-95 lbs	11 años	15 mL (3 tsp)			10 mL	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	5-10 mL (1-2 tsp)	10 mL (2 tsp)	10 mL (2 tsp)	5 mL (1 tsp)	5 mL (1 tsp)	0.6 mL				
FRECUENCIA DE DOSIFICACIÓN			Cada 4 horas/ no mas de 5 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 5 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 5 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 5 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 5 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 5 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 5 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 5 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 6 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 6 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 6 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 6 dosis diarios	Cada 4 horas/ no mas de 6 dosis diarios	refiera a las pautas de dosificar	no exceda más de 12 dosis por día		
SABORES			Cereza, Cereza Libre Del Tinte, Uva	Cereza, No Manchando La Cereza, Chicle, Uva	Cereza, No Manchando La Cereza, Uva	Baya Libre Tinte	Baya Libre Tinte	Chicle	Cereza	Cereza	Uva	Cereza	Frambuesa	Uva	Cereza, Chicle	Uva	Uva Libre Tinte	Original y Libre Tinte	

Instrucciones importantes para el uso apropiado: Lea y siga las instrucciones de la etiqueta en todos los productos de PediaCare® • Guarde todas las medicinas fuera del alcance de niños. No administre la medicina adulta a los niños • Si usted tiene cualesquiera preguntas, llame 1-888-474-3009 días laborables del 8:00 am-8:00PM (EST)
Nota: Cuando posible: Utilice el peso para dosificar, si no use la edad. El niño debe ser pesado idealmente antes de dar los productos de PediaCare®. **Los profesionales del cuidado médico deben ser consultados para dosificar en niños bajo edad de dos y en niños bajo edad de seis para ciertas medicinas de la tos, del frío y de la alergia.**

ALERTA: La concentración del acetaminophen ha cambiado en el producto infantil de 80mg/0.8ml a 160mg/5ml

Revised Aug. 2011

*Dosificación Profesional Solamente